

## 1 CONDUITE A TENIR DES SOIGNANTS

○ **Surveillance du patient**

Surveillance de la température 2 fois par jour, si le patient présente des signes de détresse respiratoire, contactez l'HAD puis le 15 si son état présente une urgence vitale.


○ **Patient non atteint par le COVID-19**



Organisation des soins	
Inclus dans la tournée du soignant sans priorisation.	
Hygiène des mains	
	<p>Priorité au soluté hydro alcoolique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avant et après tout soin,</li> <li>- Entre 2 patients,</li> <li>- Entre 2 activités,</li> <li>- Après le retrait des gants.</li> </ul> <p>Plus rapide et plus efficace que le lavage des mains au savon.</p>
Masque	
	Le port du masque est <b>recommandé</b>
Equipement de protection individuelle supplémentaire	
<p>Respecter les précautions « <b>standard</b> »</p> <p>Gants, surblouse, tablier, charlotte, lunettes, sur-chaussures :  à enfiler <b>s'il y a un risque de contact avec des liquides biologiques</b> lors des soins.</p>	

Pour toute question, contacter l'HAD de l'Aven à Etel au : **02 97 210 727**

○ **Patient atteint du COVID-19 ou présentant des symptômes respiratoires et/ou de la fièvre**



Ou présentant des symptômes respiratoires et/ou de la fièvre

**Organisation des soins**

- **Terminer** l'organisation des soins par les patients positifs ou à risque,
- **Regrouper les soins** à réaliser,
- **Limiter le nombre** d'intervenants,
- **Demander au patient de porter un masque** avant d'entrer dans le domicile ou la chambre.

**Hygiène des mains**



Priorité au soluté hydro alcoolique :

- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants.

Plus rapide et plus efficace que le lavage des mains au savon.

**Masque**



Port du masque chirurgical **obligatoire**  
Durée d'utilisation : 4h consécutif puis à éliminer dans les DASRI.



Masque FFP2 **uniquement préconisé pour les soins à risque particulier d'aérosolisation** (aérosolthérapie, aspiration trachéale).

**Équipement de protection individuelle supplémentaire**

Porter l'équipement des précautions « gouttelettes » et « contact »



- **Charlotte** (1/soin),
- **Surblouse ET tablier** étanche (1/j)
- **Gants** (1 paire/soin),
- **Sur-chaussures** (1 paire/soin),

(À jeter dans les DASRI après l'utilisation).



**Lunettes si risque de projection ou aérosolisation** (à garder tout le temps de la prise en charge, à désinfecter après chaque utilisation).

**Consignes de rangements des équipements de protection individuelle**



Sont à conserver pour 1 journée par intervenant (identifié au nom du soignant sur le pied à perfusion ou porte manteau) :

- Surblouse
- Tablier

