

Matériel nécessaire


- Lingettes désinfectantes
- Soluté hydro alcoolique (SHA)
- Gants à usage unique non stériles
- Blouse à usage unique
- Pansement adhésif transparent 15X20
- Set de réfection pansement picc line avec grip lock comprenant :
 - o 1 essuie main
 - o 2 masques
 - o 1 charlotte
 - o 2 bandelettes adhésives stériles

- o 1 champ patient stérile
- o 10 compresses 10X10 stériles non tissées
- o 1 ampoule de NACL 0,9% 20ml
- o 1 seringue 20ml
- o 1 aiguille 18 G
- o 1 pansement de fixation Grip lock®
- o Valve bidirectionnelle (inutile dans ce cas)
- o Pansement adhésif transparent 10X15
- o 2 paquets de 2 compresse
- Sacs poubelle (DASRI, Ménager, emballages)
- Produits de décontamination cutanée : détergent (type Bétadine Scrub®), NACL 0,9% 5ml antiseptique alcoolique (type Bétadine alcoolique ®).



Après avoir désinfecté le point d'insertion du cathéter périnerveux en 4 temps, coller un système de fixation type GRIP LOCK®

1



Poser une compresse pliée en 2 sur le pansement de fixation (laisser le point d'insertion visible)
Enrouler le cathéter sur une compresse stérile

2




Recouvrir tout le cathéter avec une compresse stérile

3



Coller le pansement adhésif transparent pour recouvrir le point d'insertion jusqu'au clip de fixation du cathéter

4



Fixer la tubulure entre le clip et le filtre avec une bandelette adhésive

5

Refaire le pansement tous les 7 jours ou s'il est décollé ou souillé