Charte du patient hospitalisé

Qualité/sécurité certifiées par la haute Autorité de Santé

SURVEILLANCE PENDANT 2H

APRÈS LA FIN DE LA TRANSFUSION

Apparition de :

- Fièvre
- Frissons
- Difficultés respiratoires
- Douleur(s)
- Coloration anormale des urines
- Réaction cutanée

EN CAS D'URGENCE VITALE, CONTACTER LE **15**

HAD
HÔPITAL À DOMICILE DE L'AVEN À ETEL

Pour en savoir davantage sur les clés d'un parcours réussi en HAD

Scannez le QR Code !

24H 7J **02 97 210 727**

Photos : Freepik Pois Chiche Design

www.had-lorient.fr

HAS Qualité des soins confirmée Établissement certifié

HAD
HÔPITAL À DOMICILE DE L'AVEN À ETEL

TRANSFUSION SANGUINE EN HAD




La qualité et la sécurité de l'Hôpital, le confort de la maison

COMMENT SE DÉROULE VOTRE TRANSFUSION SANGUINE EN HAD ?



Visite

Visite de l'IDEC de l'HAD et présentation de la la transfusion en HAD




Prise de sang

Prise de sang réalisée à domicile par votre Infirmière libérale ou au laboratoire



Transfusion

Transfusion à domicile réalisée par l'IDEC de l'HAD



Surveillance

Votre entourage vous surveille pendant les 2h qui suivent la fin de la transfusion. Le Médecin HAD est joignable tout au long de l'acte transfusionnel



Compte rendu

Un compte rendu du séjour en HAD est adressé à votre médecin traitant et/ou le médecin hospitalier qui vous suit

QUEL EST VOTRE RÔLE ET CELUI DE VOTRE ENTOURAGE DANS LA PRISE EN CHARGE ?

AVANT VOTRE ADMISSION EN HAD

Remettre à l'HAD les documents suivants :

Pièce d'identité, carte vitale, prescriptions médicamenteuses

LE JOUR DE LA TRANSFUSION

N'utilisez pas votre carte vitale :




vos médicaments, les soins infirmiers sont pris en charge par l'HAD

PENDANT 2H APRES LA FIN DE LA TRANSFUSION

Votre entourage assure une surveillance rapprochée à vos côtés

Durant la cure, soyez attentif aux effets indésirables !



Contacter l'HAD dans les plus brefs délais au 02 97 21 07 21 pour nous informer de tout symptôme inhabituel ou inconfort

Un médecin est joignable pendant tout le temps de la transfusion et pendant 2h après la fin de la transfusion